

MARCHE A SUIVRE

1. Position d'asymétrie de la prise du sein «extrême» pour dégager la lèvre supérieure et le frein labial –l'épaule de l'enfant se trouve en regard de votre sternum-. Veiller à l'angle d'ouverture de la bouche et à ce que les lèvres soient retroussées.
2. Si amélioration grâce à la position → ne rien faire (terminer le Daktarin qui avait été prescrit pour l'enfant lors d'une précédente consultation.
3. Si la douleur persiste + culture positive à germe pathologique → vérifier antibiogramme et prendre **tout** le traitement.
4. Si la douleur persiste + culture positive à germe pathologique ou non pathologique et/ou antibiogramme intermédiaire ou résistant → prendre Triflucan et contacter le médecin.
5. Si la douleur persiste + culture négative → prendre Triflucan
 - Et si après 4 à 5 jours cela ne va pas mieux ou cela va mieux mais n'est pas fini, recontacter le médecin par téléphone
 - Vous pouvez tenter l'antibiotique

PRESCRIPTION

1. MUPIDERM
Appliquer trois fois par jour pendant 5 jours
2. TRIFLUCAN 100 mg
Deux gélules le premier jour puis une gélule par jour pendant 10 jours.
A renouveler 10 autres jours
3. ORBENINE 500 mg (CLOXACILLINE)
Deux gélules matin et soir pendant 10 jours.
A renouveler 5 jours.
4. IBUPROFENE 200 mg
Un à deux, matin, midi et soir aux repas.
A arrêter si vous avez mal à l'estomac. 1 boîte
A renouveler 1 fois.